

Луговой мотылек (отрождение гусениц)



При проведении фитосанитарного мониторинга специалистами отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области в районах степной зоны на посевах подсолнечника отмечено начало отрождения гусениц лугового мотылька.

Гусеницы развиваются в течение 10-30 дней в зависимости от температуры, достигая в последнем 5 возрасте 35 мм. Окраска гусениц изменчива: от светло-зеленой до серо-зеленой, иногда почти черной. На спинной стороне - темная полоса и по две полосы по бокам. Голова черная со светлым рисунком.

Гусеницы повреждают листья, выгрызая отверстия, скелетируют их или съедают листовую пластинку полностью, оставляя одни черешки, иногда они объедают стебли и генеративную часть растений. Поврежденные растения отстают в росте или погибают.

В условиях высокой температуры и сухой погоды развитие гусениц и их питание усиливается.

Борьбу целесообразно проводить против гусениц 1-3 возраста, против 4-5 возрастов она малоэффективна.

Рекомендуем сельскохозяйственным товаропроизводителям вести контроль за посевами сельскохозяйственных культур (горох, люцерна, подсолнечник, кукуруза, рапс и др.), при выявлении численности гусениц выше порога вредоносности (5-10 гусениц/м²), провести инсектицидную обработку согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».

При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности.

Для проведения фитосанитарных обследований на выявление вредных объектов и получения рекомендаций обращаться в Исилькульский районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области.

Ведущий агроном

И.В. Щепак