

## Льняной трипс (имаго) на льне



Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области сообщает о начале заселения льняным трипсом посевов льна масличного.

Вредитель вредит на посевах льна в стадиях личинки и имаго. Поврежденные растения отстают в росте, сильно ветвятся, давая много боковых побегов с недоразвитыми коробочками, листья скручиваются, бутоны опадают, коробочки

с семенами растрескиваются. Вследствие чего снижается урожайность, семена становятся щуплыми, имеют плохую всхожесть, низкое содержание масла. Массовому размножению трипса благоприятствует теплая сухая погода. Вредоносность усиливается в засушливые годы.

Рекомендуем вести систематические наблюдения за посевами льна и при выявлении численности вредителя выше ПВ (3 экз. на растение при заселении более 20% растений в фазу бутонизация - цветение) провести инсектицидные обработки согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».

При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности.

Для проведения фитосанитарных обследований на выявление вредных объектов и получения рекомендаций обращаться в Исилькульский районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области.

Ведущий агроном

И.В.Щепак

Исп.: И.В.Щепак